

DESCRIÇÃO DE *OXYAGRION FERNANDOI* SP. N.
E INTERPRETAÇÃO FILOGENÉTICA DA NERVURA CÚBITO-ANAL (CAC)
(ODONATA, COENAGRIONIDAE) ⁽¹⁾

(Com 7 figuras)

JANIRA MARTINS COSTA ⁽²⁾

Museu Nacional - Rio de Janeiro

Oxyagrion fernandoi sp. n.

(Figs. 1-7)

Macho. Coloração - cabeça com face dorsal preta, exceto o labro, área genal e pós-clípeo; labro esverdeado; área genal e face anteumeral clara; pós-clípeo esverdeado; sintórax esverdeado, enegrecido de cada lado da carena dorsal; pontuações escuras laterais, concentradas na face anteumeral e não alcançando o metaepímero; patas com a face externa da tíbia amarelada; pterostigma vermelho; asas hialinas; primeiro e segundo segmentos abdominais pretos látero-dorsalmente (como em *Oxyagrion basale* Selys, 1876); terceiro ao sexto segmentos vermelhos, com articulações levemente circundadas de preto; sétimo ao nono escurecidos; décimo, de base vermelha, com mácula provavelmente azul, ocupando quase todo o segmento - no inseto morto, esta mácula não se apresenta bem evidenciada, entretanto, a coloração deve-se à presença de pigmentos e, às cores comuns (azul, vermelho e amarelo) que, geralmente, desaparecem depois da morte, assu-

(1) Entregue para publicação em 29/09/1984. Aceito em 10/11/1988.

(2) Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).