

A synopsis of the genus *Telebasis* (Odonata: Coenagrionidae)

Rosser W. Garrison

Plant Pest Diagnostic Branch, California Department of Food and Agriculture,
3294 Meadowview Road, Sacramento, CA 95832-1448, USA.
<rgarrison@cdfa.ca.gov>

Key words: Odonata, dragonfly, Coenagrionidae, *Telebasis*, *Helveciagrion*, synonymy, synopsis, new species, South America.

ABSTRACT

In this synopsis all 50 species of the primarily neotropical genus *Telebasis* are keyed, diagnosed, and illustrated. *Helveciagrion* is considered a junior subjective synonym of *Telebasis*, *T. coccinata* a junior subjective synonym of *T. coccinea*, and *T. limoncocha* a junior subjective synonym of *T. griffinii*. Six new species from South America are described: *T. carvalhoi* (holotype ♂: Brazil, Pará State, Floresta Nacional de Carajás, Parauapebas, S11D-C, 6°02'59"S, 49°53'24"W, ix 2005, leg. N. Ferreira Jr., in UFRJ); *T. corbeti* (holotype ♂: Peru: Madre De Dios Department, Tambopata-Candamo Reserved Zone, Camp 3, Collpa, Río Tambopata west bank, 13°08'31"S, 69°36'46"W, 17 ix 1992, leg. M. Butt, in BNHM); *T. farcimentum* (holotype ♂: Colombia: Valle del Cauca Department, Cali, 3°26'14"N, 76°31'21"W, 01 viii 1972, leg. N.B. Stiles, in FSCA); *T. leptocyclia* (holotype ♂: Brazil: Rondônia State, Abuna, 9°42'S, 65°23'W, 112 m, 09 iii 1922, leg. J.H. Williamson, J.W. Strohm, in UMMZ); *T. levis* (holotype ♂: Guatemala, El Petén Department, Uaxactun, 03 v 1931, leg. A. Murie, in UMMZ); and *T. williamsoni* (holotype ♂: Colombia: Magdalena Department, El Banco, 9°02'50"N, 73°58'41"W, 46 m, 25 i 1917, leg. J.H. Williamson, E.B. Williamson, in UMMZ).

RESUMEN

En esta sinopsis del género mayormente neotropical *Telebasis* se proveen claves, diagnónis e ilustraciones de sus 50 especies. *Helveciagrion* se considera un sinónimo junior subjetivo de *Telebasis*, *T. coccinata* un sinónimo junior subjetivo de *T. coccinea* y *T. limoncocha* un sinónimo junior subjetivo de *T. griffinii*. Seis nuevas especies de América del Sur son descriptas: *T. carvalhoi* (holotipo ♂: Brasil, Estado de Pará, Floresta Nacional de Carajás, Parauapebas, S11D-C, 6°02'59" S, 49°53'24" W, ix 2005, leg. N. Ferreira Jr., en UFRJ); *T. corbeti* (holotipo ♂: Perú: Departamento de Madre De Dios, Tambopata-Zona Reservada Candamo, Campamento 3, Collpa, banda oeste del Río Tambopata, 13°08'31"S, 69°36'46"W, 17 ix 1992, leg. M. Butt, en BNHM); *T. farcimentum* (holotipo ♂: Colombia: Departamento de Valle del Cauca,