

DESCRIÇÃO DE «*OXYAGRION SANTOSI*» SP. N. (ODONATA, COENAGRINIDAE)

Janira Pedreira Martins


(Com 8 figuras)

Algumas espécies do gênero *Oxyagrion* Selys, 1876, são difíceis de identificar com segurança pela literatura, já que delas só se conhece a diagnose original, insuficiente para tal mister. Entretanto, tal dificuldade foi superada, já que Santos conseguiu identificá-las após comparação que efetuou em outubro de 1964 com os tipos depositados no Instituto de Ciências Naturais de Bruxelas. Examinando material ainda não identificado do gênero acima, da coleção do Museu Nacional, encontramos uma espécie nova, cuja descrição se segue.

Oxyagrion santosi sp. n.

Oxyagrion sp. Santos, 1966, *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 10 (3): 68 (Poços de Caldas, MG).

Macho — Coloração — Cabeça amarela na face ventral e lábio, vermelho escuro na porção dorsal; manchas pós-oculares amareladas. **Tórax** avermelhado na metade superior, amarelado na metade inferior e na face ventral; pernas amareladas; pterostigma avermelhado. **Abdômen** avermelhado na face látero-dorsal do 2º ao 6º segmento e amarelado na face látero-ventral; 7º, 8º e 10º segmentos pretos dorsalmente e vermelhos lateralmente; 9º segmento todo azul; apêndices anais vermelhos.



Oxyagrion santosi sp. n. — Fig. 1: Apêndices anais superiores, vista posterior; fig. 2: apêndices anais, vista dorsal; fig. 3: pterostigma da asa anterior; fig. 4: apêndices anais, vista lateral; fig. 5: pênis, vista lateral; fig. 6: pênis, vista ventral; fig. 7: protórax e fossetas genitais da fêmea (Allotypus); fig. 8: apêndice anal inferior, vista frontal (figuras 1 - 6 e 8, paratypus macho; P — proeminência do apêndice anal superior; F — fossetas genitais do sintórax da fêmea). Figura 7 na escala menor, as demais na escala maior.

Nervação — Pós-nodais, na asa anterior, 9 (H) (2,5%), 10 (H) (30%), 11 (32,5%), 12 (20%) ou 13 (15%); na asa posterior, 8 (10%), 9 (H) (47,5%), 10 (32,5%), 11 (7,5%)