

ACTA BIOLOGICA VENEZUELICA

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y NATURALES

SECCION DE BIOLOGIA

CARACAS - VENEZUELA

Vol. 1, Art. 9

16 de junio de 1953

UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO **NEONEURA** (ODONATA: PROTONEURIDAE) DE VENEZUELA

J. Rácenis

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Sección de Biología

Neoneura gaida sp. n. (Fig. Nº 1)

Holotipo ♂: El labro verde, con un punto mediano de color negro; anteclipeo verde; postclipeco verde, con dos manchas triangulares laterales de color negro; la parte anterior del frente aceitunada, la parte posterior y el vertex con un dibujo negro situado de la manera siguiente: una mancha irregular entre los tres ocelos, con dos ramas laterales y una rama anterior trifurcada saliendo frente al ocelo mediano; dos rayas laterales que se empiezan en el ángulo frontal y se extienden, haciéndose más y más anchas, hacia la cresta occipital, pasando por las bases de las antenas y cerca de los ojos compuestos; de estas rayas, frente a cada ocelo lateral, sale una rama transversal; una raya estrecha transversal que pasa cerca de la cresta occipital, conectada con la mancha interocelar mediana pero no con las rayas laterales. Las genas aceitunadas; postgenas negras con dos rayas amarillas que pasan