

ACTA BIOLOGICA VENEZUELICA

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE BIOLOGIA

CARACAS - VENEZUELA

Vol. 3, Art. 27 de diciembre de 1960

CUATRO NUEVAS ESPECIES DEL GENERO EPIPLEONEURA (ODONATA: PROTONEVRIDAE)

J. Rácenis

Universidad Central de Venezuela
Escuela de Biología

El género *Epipleoneura* fue establecido por WILLIAMSON en el año 1915 con el generotipo *Epipleoneura lamina* WILLIAMSON 1915. En este mismo trabajo WILLIAMSON describe dos especies más de este género, e. g., *E. fuscaenea* y *E. incusa* y atribuye, como probables integrantes para este género también las especies *Protoneura ephippigera* SELYS 1886, *P. humeralis* SELYS 1886, *P. tenuis* SELYS 1860 y *P. capilliformis* SELYS 1886. De éstas cuatro últimas, *tenuis* seguramente no pertenece a *Epipleoneura*, sino es un típico *Protoneura*, como lo han mostrado COWLEY & GLOYD (1938) y COWLEY (1941). De *humeralis* SELYS conocía solamente la hembra y la consideraba como la posible hembra de *ephippigera*. Sin embargo, SJOESTEDT (1918) hizo la descripción del macho y la redescipción de la hembra de esta especie, de la cual es evidente que *humeralis* es un miembro de *Epipleoneura*. SCHMIDT (1952) atribuye la especie *ephippigera* definitivamente al género *Epipleoneura*. El status de *capilliformis* todavía queda bastante confuso y su pertenencia al uno de