

Zwei neue neotropische Calopterygiden (Odonata).

Von Dr. F. Ris (Rheinau).

(Mit 2 Figuren im Text.)

Die folgenden zwei Einzelbeschreibungen mögen ihre Rechtfertigung finden in der etwas außergewöhnlichen Natur der Objekte und in der Unmöglichkeit, eine umfassendere Darstellung in absehbarer Zeit zu bringen.

1. *Euthore Fassli* nov. spec. (Fig. 1).

6 ♂ Monte Socorro und Santa Margarita 2300 m, West Cordillere Columbia, VII. 1909, leg. A. H. Fassl (Samml. Ris).

Am nächsten der *E. fasciata* Selys, doch verschieden durch eine Reihe von Merkmalen: größer als Exemplare von *fasciata* kolumbischer Herkunft; Grundfarbe der Flügel gelb; die postnodale schwarze Binde schmäler und mehr proximalwärts gelegen; die Opalbinde an deren proximalem Rand schmäler und gelb statt weiß, dichter, schräg begrenzt.

♂. Occiput schwarz. Basisstück der Unterlippe gelblich, der Rest schwarz. Oberlippe schwarz mit zwei gelben Punkten. Ante- und Postclypeus schwarz. Genae oben und unten gelb, in der Mitte schwarz. Stirn und Scheitel schwarz, zwei rotgelbe Punkte zwischen den Fühlerbasen und zwei rotgelbe Keilfleckchen auf dem Occipitalrand. Thorax schwarz, hellgelb gezeichnet: schmale Linien nahe der Mediannäht, am ventralen Ende divergent und den Rand des tiefen Sinus begleitend; Querstrichel am Flügelsinus; etwas breitere Linie vorne an der Schulternäht nicht ganz bis zum dorsalen Ende; schmäler Keilfleck hinten am dorsalen Ende der Schulternäht; breitere Linie schräg über die vordere Seitennäht von der Coxa 2 nach dem dorsalen Rand des Metepisternum, am oberen Ende in einem Häkchen nach hinten gebogen; ebensolche Linie über die hintere Seitennäht, ventral gegabelt, ein Ast über das Stigma nach dem ventralen Ende der vorderen Seitennäht; Saum der ventralen Kante des Metepimeron, gegabelt mit dorsalem Ast über die Mitte des Metepimeron. Ventralseite trüb gelbbraun, weißlich bereift,