

DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO "LEPTAGRION" SELYS, 1876 (Coenagriidae, Odonata)¹

NEWTON DIAS DOS SANTOS
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 8 figuras no texto)

Leptagrion acuta sp. n.
(Figs. 1-4)

♂. *Coloração* — Labro, genas, clipeo e porção vertical da fronte, exceto faixa mediana em forma de halteres, de coloração azul; porção dorsal da cabeça negra, exceto duas raías ocreas, paralelas, de cada lado, entre o ocelo lateral e ôlho, não atingindo êste, porém; área correspondente às máculas pós-oculares, também ocrácea. Protórax ocráceo, exceto faixa negra dorsal; sintórax com a face anteumeral negra; com 3 faixas fracamente azuladas e mais ou menos paralelas, a primeira na face anteumeral, acima e adjacente à sutura umeral; a segunda e a terceira, respectivamente, no meso-epímero e no meta-epímero; espaço entre estas faixas, ocráceo; pernas amarelo-pálido, com raia negra na face externa dos fêmures. Abdômen com os segmentos 3-6 com anéis bruno-escuro no 1/3 distal, precedidos de estreito anel amarelo-pálido e com outro anel idêntico na extremidade proximal; espaço entre os anéis amarelos de coloração bruno-clara; segmentos 1 e 2 com faixa esverdeada lateral, mal delimitada; dorso dos mesmos bruno-escuro; 7.^o segmento amarelado no 1/3 proximal, bruno escuro nos 2/3 distais; 8.^o-10.^o quase negros bem como os apêndices anais. Pterostigma negro.

Nervação — Pós-nodais, na asa anterior, 13; na asa posterior, 12; *M* 2, na asa anterior, ao nível da 7.^a *poc*; na asa posterior, ao nível da 6.^a; *M* 1a, na asa anterior, ao nível da 10.^a *poc*; na asa posterior, ao nível da 9.^a; asa peciolada até *cac*; esta, na asa anterior, mais próxima da 1.^a *anc*; na asa posterior, entre a 1.^a e a 2.^a *anc*; célula discoidal, na asa anterior, com o lado

¹ Recebido para publicação a 27 de julho de 1961.