

**“LEPTOBASIS TUBERCULATA” SP. N. E NOTAS SOBRE
“LEPTOBASIS VACILLANS” SELYS, 1877
(Coenagriidae, Odonata)¹**

NEWTON DIAS DOS SANTOS
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 11 figuras no texto)

***Leptobasis tuberculata* sp. n.**

♂. *Coloração* — Ocrácea com anéis brunos na extremidade distal dos segmentos 3-6; faces látero-dorsais, 3.^o ao 7.^o segmentos, com difuso e fraco escurecimento; pequena mácula escura no 1/3 dorsal do 1.^o segmento e uma subterminal no dorso do 2.^o segmento; 10.^o segmento e apêndices anais ocráceos; porção lateral do 8.^o e parte do 9.^o com escurecimento. Pterostigma ocráceo-claro (Exemplar imaturo).

Nervação — Pós-nodais, na asa anterior, 10; na asa posterior, 8 e 9; *M* 2, na asa anterior, ao nível da 5.^a *poc*; na asa posterior, ao nível da 4.^a; *M* 1.^a, na asa anterior, ao nível da 7.^a *poc* ou da 8.^a; na asa posterior, ao nível da 7.^a; célula discoidal, na asa anterior, com o lado costal do mesmo tamanho que o proximal e cerca de 1/3 da base; na asa posterior, cerca de 2/3 da base; árculo, na asa anterior, ao nível da 2.^a *anc*; na asa posterior, ligeiramente distal da 2.^a; pecíolo, na asa anterior, estendendo-se ligeiramente além de *cac* numa distância menor que metade desta; na asa posterior, estendendo-se até *cac*; esta, ligeiramente distal do meio da distância entre a 1.^a e a 2.^a *anc*; espaços antenodais, na asa anterior, como 1,5: 1,2: 2,2 (mm).

Outros caracteres — Sintórax com dois tubérculos acuminados, conforme se vê na figura, de perfil triangular; lobo posterior do protórax pequeno, retangular, de bordo espesso. Unhas com nítido dente inferior.

Apêndices anais superiores foliáceos, com a extremidade distal dobrada para baixo, a face dorsal com uma depressão central; inferiores conforme figura.

¹ Recebido para publicação a 8 de março de 1961.