

DUAS NOVAS ESPÉCIES DO GÊNERO “MESOLEPTOBASIS” SJÖSTEDT, 1917 (Coenagriidae, Odonata)¹

NEWTON DIAS DOS SANTOS
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 13 figuras no texto)

Desde a descrição original de SJÖSTEDT não tem havido mais nenhuma referência a este gênero, salvo na chave de MUNZ e no recente trabalho de ST. QUENTIN. O exame de copioso material dos gêneros do grupo *Leptobasis* pertencente às coleções do Museu de Zoologia da Universidade de Michigan (Estados Unidos) permitiu, entre outras, reconhecer duas novas espécies do gênero *Mesoleptobasis*, uma delas com material relativamente abundante.

Agradecemos aos Drs. Theodore Hubell e Dr. Irving Cantrall, respectivamente Diretor do Museu e Curador da Divisão de Insetos do Museu de Zoologia, a oportunidade de estudar o mencionado material.

Mesoleptobasis cantralli sp. n. (Figs. 1-3, 8, 10, 11, 13)

♂. *Coloração* — Exemplares imaturos de coloração geral ocrácea com faces látero-dorsais do abdômen enegrecidas do 1.º ao 6.º segmento na sua metade superior; segmento 7.º totalmente enegrecido; 8.º e 10.º ocráceos com reflexos avermelhados. Exemplares maduros com coloração amarela ou ocrácea apenas nas seguintes áreas: porção inferior da cabeça, lábio, bordo do labro, metade inferior das genas, dois pontos no pós-clípeo, linha contornando anteriormente o ocelo mediano e máculas pós-oculares cuneiformes; no ápice posterior de cada uma destas, área puntiforme mal delimitada, com brilho azulado; porção restante da cabeça negra. Nos exemplares aparentemente muito maduros, só aparece a porção azul da mácula pós-ocular, a porção cuneiforme aparecendo enegrecida. Tórax, nos exemplares muito maduros, com a face ante-umeral com duas faixas adjacentes, a externa enegrecida e um pouco metálica e a interna clara; exemplares imatu-

¹ Recebido para publicação a 19 de abril de 1961.