

miera longitudinalis; sporangius globosus, 14-35 miera; columellae maiores hemisphaericae vel hemicylindricae, 4-8 miera in basi et 8-14 miera altitudinis. minoris subrotundae, 4-8 miera; pars maior sporum subrotunda, 38 miera; chlamydospori copiosi.

BIBLIOGRAFIA

- 1 — Klincksieck, P. & Valet, Th., 1908, *Code des Couleurs*, 86 pp, 5 figs, Paris (600 amostras de cores).
 - 2 — Verna, L. & Herrero, F. J., 1952, *Micologia*, 740 pp, 286 figs, Buenos Aires
 - 3 — Gilman, J. C., 1957, *A Manual of Soil Fungi*, 450 pp, 153 figs, XIII ests. Iowa State College Press, Second. Ed. U.S.A.
 - 4 — Naumov, N. A., 1939, *Clés des Mucorinées*, XXXVI + 138 pp, 82 figs, Paris.
 - 5 — Fonseca, O. F., 1943, *Parasitologia Médica*, I, 737 pp, 101 ests., 8 tab., Rio de Janeiro.
- (Trabalho realizado durante o Curso de Micologia da Faculdade de Ciências Biológicas).

57 «LEPTAGRION ACULEATA» SP. N. (ODONATA, COENAGRIDAE), por Newton Dias dos Santos (Com 8 figuras).

Examinando a coleção de odonatas René Martin depositada no Museu de História Natural de Paris, pude, em outubro do ano próximo passado, constatar a existência de um exemplar da espécie acima que juntamente com outro procedente de Belém e na coleção do Museu Nacional passo a descrever. Aproveito a oportunidade para agradecer as facilidades e gentileza de Mlle. Simone Kellner-Pillault no Museu de Paris.

Leptagrion aculeata sp. n.

Macho: *Coloração* — Lábio, mandíbulas e maxilas ferrugíneos; porção inferior da cabeça quase negra; porção dorsal da cabeça quase negra exceto duas máculas esverdeadas que ficam entre o ocelo lateral e a antena (Fig. 1,A) e a estria também esverdeada adjacente ao bordo do olho, em sua metade posterior (Fig. 1,B); labro, clipeo e porção vertical da fronte amarelo claro no *holotypus*, bruno escuro no *paratypus*; labro com mácula central arredondada ocrácea. Sintorax bruno (*holotypus*) ou ocráceo (*paratypus*) com faixa mediana dorsal e com reflexos metálicos esverdeados (*holotypus*); a faixa mediana dorsal ocupa, em cada face anteumeral, um pouco mais da metade da sua largura. Pernas ocráceas totalmente (*paratypus*) ou com as faces posteriores dos fêmures bruno escuro (*holotypus*). Pterostigma ocráceo (*holotypus*) ou bruno escuro (*paratypus*). Abdômen bruno escuro na porção látero-dorsal, ocráceo nas faces látero-ventrais; a coloração bruna forma na extremidade apical do 3.º ao 7.º segmentos um anel grosso; porção amarela formando anel incompleto, interrompido dorsalmente, do 3.º ao 7.º segmentos; 8.º ao 10.º segmentos em parte ocráceo em parte bruno, sem delimitação e pouco visível. *Paratypus* como o *holotypus* do 5.º segmento em diante, porém um pouco mais escuro; 1.º ao 4.º segmentos descolorados por ação de algum corrosivo.

Nervação — Pós-nodais, na asa anterior, 10(H) ou 11(HP); na asa posterior 11(H) ou 9(P); R2, na asa anterior, na 6.º PX; na asa posterior na 5.º IR 2, na asa anterior, na 10.º PX(HP) ou na 9.º (P); na asa posterior, na 9.º PX(HP) ou na 10.º(H); AC, em ambas as asas na metade da distância entre a 1.º e a 2.º AX; peciolo até AC; triângulo, na asa anterior, com lado costal cerca de um terço da base; na asa posterior cerca da metade da base. H = *holotypus*; P = *paratypus*.

Outros caracteres — Unha com dente inferior apical e muito desenvolvido como nas demais espécies do gênero.