

«PERISTICTA GAUCHAE» SP. N. (ODONATA, PROTONEURIDAE)

Newton Dias dos Santos


(Com 7 figuras)

Excursionando pela região de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, numa altitude média de 700 metros, em companhia do Professor Hennig do Centro de Treinamento para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS), num dia esplêndido para coletas, tive a oportunidade de recolher excelente material. No rio do Pinto, no Km 93 da estrada que passa por São Francisco em demanda da pequena localidade de Tainhas foi coletado o material que serviu de base para a descrição da presente espécie.

O citado riacho, no trecho que atravessa a ponte sob a estrada, apresenta-se com largura média de quatro metros, com as águas correndo lentamente; em alguns trechos forma bacias com águas paradas, parcialmente recobertas de Pontederiaceas; a vegetação marginal ora é escassa ora com arbustos.

Peristicta gauchae sp. n.

Descrição do macho: **Coloração** — Cabeça negra, exceto o bordo do labro, as genas e a face inferior, amarelo esverdeado. Protórax e sintórax de coloração negra, com re-



Peristicta gauchae sp. n. — Fig. 1: Apêndices anais, vista dorsal; fig. 2: apêndices anais, vista ventral; fig. 3: pterostigma, asa posterior; fig. 4: apêndices anais, vista lateral; fig. 5: pênis, vista lateral; fig. 6: lobo terminal do pênis, vista ventral; fig. 7: pterostigma, asa anterior; (figs. 5 e 6, paratypus; demais figuras, holotypus macho).

flexos metálicos esverdeados, ocupando no protórax toda a face dorsal e laterais e no sintórax, o dorso e a metade superior da face lateral; metade inferior dessa face amarelo claro; pruinescência azulada fraca dos lados do protórax, ao longo da sutura umeral, dos lados do sintórax e nos fêmures; pernas negras com o bordo posterior das tíbias, ocráceo; pterostigma ocráceo claro. Abdômen negro, com reflexos esverdeados na face dorso-lateral, ocráceo na metade inferior da face lateral e na face ventral; apêndices anais superiores negros, exceto a porção inferior do ápice que é ocráceo apêndice anal inferior amarelado.

Nervação — Ârculo distal da 2ª AX numa distância igual ou menor que a extensão do ramo superior do mesmo; AC, mais próxima da 1ª que da 2ª AX; pecíolo até AC; CuP, na asa anterior, terminando entre a 3ª e a 4ª célula pósnodal; na asa posterior, na 4ª célula. Anal, uma célula longa; IR 3 proximal do subnodus; R 3, na asa anterior, ao nível da 4ª PX; na asa posterior, ao nível da 3ª PX; IR 2, na asa anterior, ao nível da 5ª PX (30%) ou da 6ª (H) (70%); na asa posterior, ao nível da 5ª PX; pósnodais