

BOLETIM DO MUSEU NACIONAL

NOVA SÉRIE

RIO DE JANEIRO - BRASIL

ZOOLOGIA — N.º 292 — 28 de dezembro de 1978

DESCRIÇÃO DE LEPTAGRION VRIESIANUM SP. N. CENAGRIONÍDEO BROMELÍCOLA (ODONATA: COENAGRIONIDAE)

(Com 14 figuras)

NEWTON DIAS DOS SANTOS

MUSEU NACIONAL, RJ

Descrição do holotypus macho

Coloração — Cabeça negra na face dorsal com estria verde amarelada entre o ocelo e a antena; esta negra; pós-clípeo com quatro máculas elíticas, verde amareladas, transversalmente alinhadas e próximas da base; espaço entre elas negro; porção vertical da fronte, anteclípeo e labro, verde amarelado; labro com mácula negra, mediana e basal com os cantos marginados de negro; face inferior da cabeça com lábio pálido e metade inferior dos olhos azul claro. Protórax ocráceo escuro; face anteumeral com faixa escura quase negra, com reflexos metálicos esverdeados ao nível da carina dorsal, estendendo-se lateralmente além da metade da face; faces laterais ocráceas na metade superior, claras na metade inferior (esverdeadas no exemplar vivo). Fêmures com faces flexoras pálidas, ocráceas nas partes restantes e quase negros na extremidade distal; tíbias pálidas com estria escura na face externa e com as extremidades distais quase negras; tarsos quase negros exceto porção mediana do segundo artigo, ocrácea; unhas e dentes negras dorsalmente, mais claras lateralmente; pterostigma pálido. Abdômen escuro látero-dorsalmente do primeiro ao sétimo segmento, com reflexos metálicos, alargando-se lateralmente no sexto e sétimo; faces látero-ventrais do primeiro ao sétimo amarelado claro, formando uma mácula lateral na base dos segmentos três a sete; oitavo, nono e décimo segmentos azuis, com ponto escuro látero-dorsal no oitavo e nono; apêndices anais negros.