

abdomen supra nigrum; alæ anticae virides; alæ posticae fuscae.

Longueur, 5; largeur, 1 1/2 millim.

✓ *Tettigonia herbida*, Walker, *List of the specim. of Ins. col. Brit. mus.*, part. III, p. 769.

Jolie petite espèce qui se trouve à Cuba et dans l'Amérique septentrionale.

ORDRE DES NÉVROPTÈRES, *Fabr.*

Des mandibules et des mâchoires pour la mastication; six pieds et quatre ailes membraneuses et nues. Leurs ailes sont finement réticulées, et les inférieures sont ordinairement de la grandeur des supérieures, ou plus étendues dans un de leurs diamètres.

FAMILLE DES SUBULICORNES, *Latr.*

Elle se compose de l'ordre des *Odonates* de Fabricius et du genre *Éphémère*. Les antennes sont en forme d'alène, guère plus longues que la tête, de sept articles au plus, dont le dernier sous la figure d'une soie.

Nos collections de Paris renferment très-peu de Névroptères de l'île de Cuba, et cette partie de l'ouvrage n'aurait pas été en harmonie avec les autres, si nous n'avions pas eu le bonheur d'obtenir du savant qui s'est le plus occupé de ces Insectes, de M. le baron de Sélys-Longchamps, le travail suivant. M. de Sélys-Longchamps, l'un des premiers zoologistes de la Belgique, au-