

Quatrièmes Additions au Synopsis des Caloptérygines;
 par M. Edm. De Selys Longchamps, membre de l'Académie.

Le travail que j'ai accompli l'année dernière (1878) pour les Gomphines, je le fais aujourd'hui pour les Caloptérygines.

Les formes nouvelles à faire connaître dans cette sous-famille sont proportionnellement tout aussi nombreuses, et sont particulièrement intéressantes, notamment celles qui permettent de compléter les caractères des deux genres *Echo* et *Anisonevra* que j'avais établis hardiment sur les seules femelles, mais que l'examen des mâles reçus récemment est venu heureusement confirmer.

La Malaisie et l'Asie orientale d'une part, l'Amérique tropicale d'autre part, nous ont apporté un contingent notable de ces formes locales auxquelles on ne sait s'il faut donner la qualification d'espèces ou celle de races locales. Elles sont le sujet d'une étude qui au premier abord peut sembler futile, mais qui me paraît, au contraire, fort digne d'attention, parce qu'elle sert à rassembler des matériaux propres à élucider et à déterminer les lois qui président à la variabilité des espèces.

Je remarquerai, à ce propos, que parmi les Caloptérygines je vois successivement les sous-genres composés d'un type que l'on croyait unique et isolé nous fournir des formes nouvelles se plaçant dans les mêmes groupes et comblant parfois la différence qui existait entre chacun.

Quant aux coupes d'un ordre plus élevé, auxquelles j'ai